

Základní informace k hnízdění výra velkého na lokalitě Koterovský lom 6246 (PM)



Rok 1997

30.3. 1997 kontrola hnízdiště výra velkého

- hnízdění neprokázáno, hnízdo nenalezeno, přítomnost dospělých jedinců však podložena četnými nálezy zbytků potravy (2x káň lesní, 2x kalous ušatý, 1x jestřáb lesní, 1x bažant, 1x ježek, 1x zajíc a větší hlodavci) vývržků a čerstvého trusu.

Závěr – hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena.

Rok 1998

4.4. 1998 kontrola hnízdiště výra velkého

- západní strana lomu pod šípkovým keřem zjištěna samice sedící na 3 vejcích.

16.4. 1998 kontrola hnízdiště

- hnízdo opakovaně bez samice, na hnízdě 3 zastydlá vejce.

Závěr – hnízdění prokázáno, snůška zničena, příčina neznáma.

Rok 1999

3.4. 1999 kontrola hnízdiště výra velkého

- těsně pod horní hranou tělesa nalezena hnízdní jamka se dvěma vejci a sedící samicí (samice vyplašena). Na lokalitě opět velké množství zbytků potravy, vývržků a trusu.

30.4. 1999 opakovaná kontrola hnízdiště

- hnízdo zarostlé trávou bez vajec a mláďat (zničeno), příčina neznáma.
- náhradní hnízdění neprokázáno

Závěr – hnízdění prokázáno, ale neúspěšné bez mláďat.

Rok 2000

26.3. 2000 kontrola hnízdiště výra velkého

- západní strana lomu pod šípkovým keřem zjištěna samice sedící na 3 vejcích.

Průběžné kontroly sedící samice na hnízdě

- **9.4. 2000** samice na hnízdě (kontrola dalekohledem)
- **11.4. 2000** samice na hnízdě (kontrola dalekohledem)
- **20.4. 2000** samice na hnízdě, pravděpodobně vylíhlá mláďata (kontrola dalekohledem)
- **27.4. 2000** hnízdo bez mláďat i samice, na hnízdě zbytky potravy a trusu od mláďat

Závěr – hnízdění prokázáno, bohužel neúspěšné. Snůška zničena.

Rok 2001

17.3.2001 kontrola hnízdiště

- hnízdění neprokázáno, hnízdo nenalezeno, přítomnost dospělých jedinců však podložena četnými nálezy zbytků potravy (1x kalous ušatý, 1x bažant obecný), vývržků a čerstvého trusu.

16.4.2001 opakovaná kontrola hnízdiště

- hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. Opět potvrzena přítomnost dospělých jedinců.

Závěr – hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena.

Rok 2002

16.3.2002 kontrola hnízdiště

- v západní části lomu nad šípkovým keřem nalezena hnízdní jamka s 1 vejcem a sedící samicí. Zbytky potravy na hnízdě 1x kalous ušatý.

24.4.2002 opakovaná kontrola hnízdiště

- hnízdo zničeno, bez vajec a mláďat (zničeno), příčina neznáma. Na hnízdě zbytky potravy 1x kos černý M.
- náhradní hnízdění neprokázáno

Závěr – hnízdění prokázáno, ale neúspěšné bez mláďat - zničeno.

Rok 2003

13.3.2003 kontrola hnízdiště

- hnízdění neprokázáno, hnízdo nenalezeno, přítomnost dospělých jedinců však podložena četnými nálezy zbytků potravy (1x bažant obecný) vývržků a čerstvého trusu.

4.5.2003 opakovaná kontrola hnízdiště

- hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena. Opět potvrzena přítomnost dospělých jedinců.

Závěr – hnízdění neprokázáno, ale nevyloučeno. Mláďata však určitě nevyvedena.

Rok 2004

13.3.2004 kontrola hnízdiště

- západní strana lomu pod velkým kamenem blíže ke středu tělesa, hnízdí jamka s 1 vejcem a sedící samicí.

17.4.2004 opakovaná kontrola hnízdiště

- na hnízdě 2 vejce a sedící samice - kontrola dalekohledem.

30.4.2004 opakovaná kontrola hnízdiště

- na hnízdě poprvé zjištěna 2 vylíhlá pull. – kontrola dalekohledem (samice nerušena)

25.5.2004 opakovaná kontrola hnízdiště

- na hnízdě nalezena 2 uhynulá pull. beze stop cizího působení. Mláďat předána na pitvu, zajištěny zbytky potravy (1x kalous ušatý, 1x potkan)

Výsledek pitvy doložen.

Závěr – *Prokázané hnízdění s mláďaty a jejich následným úhynem.*

Příčina neznáma.

Rok 2005

20.3.2005 kontrola hnízdiště

- západní strana lomu pod velkým kamenem blíže ke středu tělesa, zjištěna vyhrabaná hnízdní jamka zatím bez vajec. Přítomnost dospělých jedinců prokázána zbytky potravy, vývržky a trusem.



26.4.2005 opakovaná kontrola hnízdiště

- na hnízdě sedící samice – kontrola dalekohledem (nerušená) počet vajec nezjištěn.



14.5.2005 kroužkování mláďat na hnízdě

- na hnízdě okroužkována 2 pull. samice vyplašena, mláďat průběžně pozorována.



14.6.2005 kontrola hnízdiště


- mládřat rozlezlá mimo hnízdo, hnízdění lze považovat za úspěšné.

Všeobecně poznámky:

- lokalita je dospělým párem obsazena od roku 1997 každoročně (prokázáno)
- předposlední úspěšné vyvedení mládřat zaznamenal Dr. S. Beneda před 18 lety kdy kroužkoval tuším 2 mládřata (podrobnosti dodám)
- tok výrů probíhá na lokalitě již od února do března
- nejdříve snesené vejce jsme měli 13.března
- mládřata opouští hnízdo koncem června

Pokud se budeme bavit o nějakém omezení (nerušení) tak navrhuji od 1. března minimálně do 31 května s ohledem na snůšku a mládřata. Ideální stav již od počátku či poloviny února.

Zjistili jsme: velice kritické jsou první dny od vyhrabání jamky a první dny sezení na vejcích. Tady je velice háklivá na vyrušení, na hnízdo se vrací za dlouho, vejce jsou pak vystavena náporu počasí a predátorů. Také se párkrát stalo, že se samice na hnízdo už nevrátila. Je to čistě individuální záležitost, a tak první kontroly provádím dalekohledem a nebo později. Když jsou mládřata vylíhnutá, samice už sedí trpělivě, ale zase záleží na počasí a místních podmínkách.



Snad to zatím stačí, chtěl jsem to už udělat komplet i s návrhy opatření, ale nezvládám to vůbec a pořád řeším pacienty v terénu. Moc se omlouvám a dodám co nejdříve.

S pozdravem.
Karel Makoň

(mobil. 777145960)

